

BEST DIAMOND PREMIUM

10-3-3 ፈሳሽ ኦርጋኖሚኔራል ማዳበሪያ



ጠንካራ እድገት • ሚዛናዊ አመጋገብ • ከፍተኛ የምርት አቅም

ለቡና፣ አቮካዶ፣ ፓፓያ፣ አትክልት፣ እህል እና የፍራፍሬ ዛፎች የአጠቃቀም መመሪያ

ለሙያዊ አጠቃቀም፡፡ መጠኑን እንደ ሰብል፣ አየር ንብረት፣ አፈር እና መስኖ ሁኔታ ያስተካክሉ፡፡



የምርት ትንተና እና አጠቃላይ አጠቃቀም

BEST DIAMOND ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ፣ ፖታሲየም እና ኦርታኒክ ንጥረ ነገር የያዘ ፈሳሽ ማዳበሪያ ነው። የሥር፣ ቅጠልና ቀንበጥ እድገትን እና ከጭንቀት በኋላ ማገገምን ይደግፋል።

የተረጋገጠ ይዘት	% w/w
ኦርታኒክ ንጥረ ነገር	15
ጠቅላላ ናይትሮጅን (N)	10
አሞኒየም ናይትሮጅን	3
ዩሪያ ናይትሮጅን	7
ፎስፈረስ (PO)	3
ፖታሲየም (KO)	3
pH	4.6-6.6

ዋና ጥቅሞች

- የሥር፣ ቅጠል እና አዲስ ቀንበጥ እድገትን ይደግፋል።
- ሚዛናዊ እና ጠንካራ የተክል እድገትን ያበረታታል።
- ከሙቀት፣ ከውሃ እጥረት እና ከተከላ ጭንቀት በኋላ ማገገምን ይደግፋል።

አጠቃላይ መጠን

የአጠቃቀም ዘዴ	መጠን	ፕሮግራም
በቅጠል	200-250 ml / 100 L ውሃ	በ10-15 ቀን ልዩነት 2 ጊዜ
ወጣት/ስሱ ተክል	100-150 ml / 100 L ውሃ	2 ጊዜ
በጠብታ መስኖ	3 L / ሄክታር	በ10-15 ቀን ልዩነት 2 ጊዜ
በእፈር	3 L / ሄክታር	2 ጊዜ

1 ሄክታር = 10 ዴካር። 3 L/ha ከ300 ml/decare ጋር እኩል ነው።



አትክልቶች

ለቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ኤግፕላንት፣ ኪያር፣ ዱባ፣ ጎመን እና ሌሎች አትክልቶች፡፡

ጊዜ	በቅጠል	በጠብታ	ብዛት
ከተከለ 7-10 ቀን በኋላ	200 ml/100 L	3 L/ha	1
አበባ/ፍሬ ማሰር ሲጀምር	200-250 ml/100 L	3 L/ha	1

ጠቅላላ 2 ጊዜ፡፡ በትክክለኛ አጠቃቀም እስከ 20% የምርት ጭማሪ አቅምን ይደግፋል፡፡

በአትክልት ላይ ተጽዕኖ

- ሥር መያዝን እና ሚዛናዊ እድገትን ይደግፋል፡፡
- የፍሬ መጠን፣ ቅርጽ፣ ቀለም፣ ጥንካሬ እና የመደርደሪያ ጊዜን ይደግፋል፡፡
- ጣዕም፣ ደረቅ ንጥረ ነገር እና ሽታ አቅምን ያበረታታል፡፡

እህሎች

ለበቆሎ፣ ስንዴ፣ ገብስ፣ ጤፍ እና ማሽላ፡፡

የእድገት ደረጃ	መጠን	ብዛት
3-5 ቅጠል / መተባበር	250 ml/100 L	1
ግንድ ከመርዘም በፊት	250 ml/100 L	1

2 ጊዜ ይጠቀሙ፡፡ እስከ 20% የምርት ጭማሪ፣ የእህል ሙላት፣ ክብደት እና ጥራትን ይደግፋል፡፡



ድንች፣ ሽንኩርት እና ጥራጥሬ

ድንች እና ሽንኩርት

ጊዜ	በቅጠል	በጠብታ
ከበቀለ 10-15 ቀን በኋላ	200 ml/100 L	3 L/ha
እባጭ/ራስ መፍጠር ሲጀምር	200 ml/100 L	3 L/ha

2 ጊዜ። እስከ 20% የምርት ጭማሪ እና የመጠን/ጥራት አቅምን ይደግፋል።

ባቄላ፣ አተር፣ ምስር፣ ሽምብራ እና አኩሪ አተር

ጊዜ	በቅጠል	ብዛት
3-5 ቅጠል	150-200 ml/100 L	1
ከአበባ በፊት	150-200 ml/100 L	1

2 ጊዜ። በትክክለኛ አጠቃቀም እስከ 20% የምርት ጭማሪ አቅምን ይደግፋል።

የፍራፍሬ ዛፎች

ለማንኛ፣ አሾካዶ፣ ሲትረስ፣ ፖም፣ ፒር፣ ፒች፣ አፕሪኮት፣ ሮማን እና ወይራ።

ጊዜ	በቅጠል	ብዛት
ከአበባ 10-15 ቀን በፊት	200 ml/100 L	1
ፍሬ ከያዘ በኋላ	200-250 ml/100 L	1

2 ጊዜ። እስከ 20% የምርት ጭማሪ፣ የፍሬ መጠን፣ ቀለም፣ ጣዕም፣ ሽታ እና ተመሳሳይነትን ይደግፋል።



ቡና

ጊዜ	በቅጠል	በአፈር
ከአበባ በፊት	200 ml/100 L	50 ml/ዛፍ
ፍሬ ከያዘ በኋላ	200-250 ml/100 L	75 ml/ዛፍ

2 ጊዜ። እስከ 20% የምርት ጭማሪ፣ የቡና ፍሬ እድገት፣ እኩል መብሰል፣ የፍሬ ሙላት፣ ጥራት እና ተፈጥሯዊ ሽታን ይደግፋል።

አሾካዶ

ጊዜ	በቅጠል	በአፈር
ከአበባ 10-15 ቀን በፊት	200 ml/100 L	75 ml/ዛፍ
ፍሬ ከያዘ በኋላ	200-250 ml/100 L	100 ml/ዛፍ

2 ጊዜ። እስከ 20% የምርት ጭማሪ፣ የፍሬ መጠን፣ ተመሳሳይነት፣ የውስጥ ጥራት፣ ጣዕም እና ሽታን ይደግፋል።

ፓፓያ

ጊዜ	በቅጠል	በጠብታ
አበባ ሲጀምር	200 ml/100 L	3 L/ha
ፍሬ ከያዘ በኋላ	200-250 ml/100 L	3 L/ha

በ10-15 ቀን ልዩነት 2 ጊዜ። እስከ 20% የምርት ጭማሪ፣ የፍሬ መጠን፣ ቀለም፣ ጥንካሬ፣ ስኳር፣ ጣዕም እና ሽታን ይደግፋል።

ሙዝ

ዘዴ	መጠን	ፕሮግራም
በጠብታ	3 L/ha	በ10-15 ቀን ልዩነት 2 ጊዜ
በቅጠል	200-250 ml/100 L	2 ጊዜ

እስከ 20% የምርት ጭማሪ፣ የዘለላ ክብደት፣ መጠን፣ ጣዕም እና ጥራትን ይደግፋል።



እስከ 20% የምርት ጭማሪ የዲላማ ፕሮግራም

በሄክታር 3 ሊትር በትክክለኛው ጊዜ 2 ጊዜ በመጠቀም፣ በቂ መስኖ እና ጤናማ የሰብል እድገት ሲኖር እስከ 20% የምርት ጭማሪ አቅም ይደግፋል።

ሰብል	በቅጠል	በሥር/ጠብታ
አትክልት	200-250 ml/100 L; 2 ጊዜ	3 L/ha; 2 ጊዜ
እህል	250 ml/100 L; 2 ጊዜ	3 L/ha; 2 ጊዜ
ቡና	200-250 ml/100 L; 2 ጊዜ	50-75 ml/ዛፍ; 2 ጊዜ
አሾካዶ	200-250 ml/100 L; 2 ጊዜ	75-100 ml/ዛፍ; 2 ጊዜ
ፓፓያ	200-250 ml/100 L; 2 ጊዜ	3 L/ha; 2 ጊዜ

የሚጠበቀው ውጤት

የተክል እድገት፣ አበባ እና ፍሬ መያዝ፣ የፍሬ/እህል ሙላት፣ ተመሳሳይነት እና ለገበያ የሚቀርብ ምርትን ይደግፋል። በቡና፣ አሾካዶ፣ ፓፓያ እና አትክልቶች ተፈጥሯዊ ቀለም፣ ጣዕም እና ሽታ አቅምን ይደግፋል።

ውጤቱ እንደ ዝርያ፣ አፈር፣ አየር ንብረት፣ ውሃ፣ በሽታ እና አስተዳደር ሊለያይ ይችላል። 20% የዲላማ አቅም ነው፤ ዋስትና አይደለም።



ትክክለኛ የአጠቃቀም መመሪያ

- ከመጠቀም በፊት እቃውን በደንብ ያናውጡ።
- ጠዋት ቀዝቃዛ ሰዓት ወይም ማታ ይጠቀሙ።
- በከፍተኛ ሙቀት፣ ነፋስ ወይም ዝናብ ጊዜ አይጠቀሙ።
- በውሃ ጭንቀት ላይ ላለ ተክል ከፍተኛ መጠን አይስጡ።
- መጀመሪያ በትንሽ ቦታ ይፈትሹ።
- በወጣት ቅጠል ዝቅተኛውን መጠን ይጠቀሙ።
- ከሌሎች ማዳበሪያዎች ወይም ፀረ-ተባዮች ጋር ከመቀላቀል በፊት የመጣጣም ሙከራ ያድርጉ።

አስፈላጊ ማስጠንቀቂያ

የተመከረውን መጠን አይበልጡ። ከመጠን በላይ መጠቀም የቅጠል ቃጠሎ፣ ከመጠን በላይ ቅጠል እድገት እና የአበባ መቀነስ ሊያስከትል ይችላል።

አምራች / አከፋፋይ: BEST GLOBAL

ይህ አጠቃላይ ቴክኒካዊ መመሪያ ነው። የአካባቢ ሁኔታ እና የተመዘገበው የምርት መለያ ቅድሚያ አላቸው።